

WASPADA ANJING RABIES



Banjarbaru, Senin 2 Maret 2020, salah seorang warga masyarakat Komplek Galuh Marindu 2 Kelurahan Sungai Besar melaporkan ada seorang anak di wilayahnya yang digigit anjing yang disinyalir mengidap rabies. Sebagian warga memberi kesaksian bahwa anjing tersebut sering terlihat galak dan seolah ingin menyerang. kesigapan masyarakat sangat utama, terbukti dengan hadirnya Drh. Widodo ke lokasi untuk segera memberikan tindakan terhadap anjing yang diduga mengidap rabies.

Hewan yang terinfeksi rabies mungkin tampak sakit, gila, atau jadi lebih ganas. Inilah asal mula ungkapan “anjing gila”. Namun, anjing yang terinfeksi rabies juga bisa terlihat terlalu ramah, jinak, atau bingung. Bahkan, terkadang anjing yang terinfeksi rabies mungkin bisa terlihat normal atau biasa saja.

Awalnya, seekor anjing yang terinfeksi mungkin menunjukkan perubahan perilaku yang ekstrem seperti gelisah, tidak bisa tenang, atau ketakutan. Anjing yang ramah mungkin menjadi lebih sensitif, atau anjing yang biasanya bersemangat bisa menjadi lebih jinak.

Anjing rabies juga mungkin menggigit atau menyerang hewan lain, manusia, dan benda mati. Anjing yang kena rabies juga mungkin terus menjilat, menggigit, dan mengunyah benda-benda tertentu. Kondisi ini biasanya disertai dengan demam.

Seiring perkembangan virus, anjing yang terinfeksi bisa menjadi sensitif terhadap sentuhan, cahaya, dan suara. Anjing mungkin makan hal-hal yang tidak biasanya dimakan dan suka bersembunyi di tempat gelap. Kelumpuhan otot tenggorokan dan rahang, mengakibatkan gejala munculnya busa atau buih di mulut anjing. Linglung dan tidak cekatan juga umumnya terjadi pada anjing rabies yang disebabkan oleh kelumpuhan kaki belakang. Tanda-tanda rabies lainnya yang umum termasuk kehilangan nafsu makan, kelemahan, kejang, dan kematian mendadak.

Masa inkubasi (waktu dari infeksi sampai saat perkembangan gejala) virus rabies pada manusia adalah sekitar 30 sampai 60 hari. Karena itu, Anda mungkin baru akan mengalami gejalanya lama setelah Anda digigit atau dicakar oleh anjing rabies. Kebanyakan orang pertama kali mengalami gejala sakit yang dimulai dengan kesemutan atau gatal yang dari tempat gigitan atau tempat masuknya virus.